

L'ESSENTIEL CALLISTO® L'HERBICIDE DE POST-LEVÉE DU MAÏS ET DU MAÏS DOUX



syngenta®



- **Composition** : mésotrione 100 g/l
- **Formulation** : SC Suspension concentrée
- **Classement** : Xi-Irritant, N-Dangereux pour l'environnement.
- **Phrases de risque** : R36, R50/53
- **DAR*** :
maïs grains et maïs fourrage = 60 jours
maïs doux = 42 jours
- **ZNT*** : 5 mètres
- **DRE** : 24 heures
- **Nombre d'applications maximum*** :
1 sur maïs possibilité de fractionner à condition de ne pas dépasser la dose de 1,5 l/ha au total.
- **Doses homologuées*** :
maïs grains et maïs fourrage = 1,5 l/ha
maïs doux = 0,75 l/ha

* pour l'ensemble des cultures, usages homologués et autres préconisations d'emploi se reporter à l'étiquette du produit ou consulter : www.syngenta.fr

Action foliaire
(à l'abri du lessivage)

Action
anti-germinative
(durée d'action)

Action racinaire

«E» Flashez ce QR-Code et accédez à la fiche technique



EFFICACE ET SÉLECTIF

La mésotrione, substance active de Callisto, a été découverte en s'inspirant d'une substance naturellement sécrétée par les racines de l'arbuste *Callistemon citrinus*.

Callisto offre :

- ✓ Un très large spectre d'efficacité sur graminées et dicotylédones.
- ✓ Un triple mode d'action :
 - Action foliaire, Callisto est rapidement mis à l'abri du lessivage en 1 heure sans pluie.
 - Action racinaire, une plus grande régularité d'efficacité, même en conditions difficiles.
 - Action anti-germinative, contrôle des levées échelonnées des adventices sensibles : chénopodes, morelle, amarante, renouée persicaire, ...


LES RÈGLES D'OR DU DÉSHERBAGE MAÏS EN POST-LEVÉE

Pour réussir votre désherbage en post-levée :

- ✓ Bien connaître la flore de la parcelle.
- ✓ Intervenir sur des adventices jeunes pour une efficacité optimale.
- ✓ Prévoir un deuxième passage en fonction de l'observation des nouvelles levées.
- ✓ Profiter des périodes d'hygrométrie les plus élevées de la journée pour réaliser les interventions.

VOS AVANTAGES

- ✓ Large spectre.
- ✓ Triple mode d'action.
- ✓ Grande régularité d'efficacité sur adventices majeures.
- ✓ Nombreuses associations possibles.



Légende spectre :

Très bonne efficacité

Bonne efficacité

Efficacité bonne à variable

Efficacité variable

Efficacité insuffisante

Pas d'information

> 95%
85 - 95 %
70 - 85 %
50 - 70%
< 50%

(1) Dose Callisto seul de 0,75 à 1,5 l/ha en fonction de la sensibilité des espèces.

(2) Dose Callisto en association de 0,5 à 0,75 l/ha.

(*) 2 applications nécessaires sur les adventices les moins sensibles ou en situations de levées échelonnées.

SPECTRE D'EFFICACITE CALLISTO SEUL OU ASSOCIÉ

	1 ou 2 passages en post-levée ^(*)		
	Callisto (1)	Callisto + Casper (2)	Callisto + Milagro (2)
Dicotylédones classiques			
Amarantes sp.			
Chénopodes sp.			
Morelle noire			
Renouée persicaire			
Renouée feuille de patience			
Dicotylédones difficiles			
Abutilon d'Avicenne ou de Théophraste			
Ambroisie à feuilles d'Armoise			
Arroche étalée			
Datura stramoine			
Fumeterre officinal	4 feuilles		
Laiteron rude			
Lampourde à gros fruits			
Mercuriale annuelle	4 feuilles	4 feuilles	
Renouée des oiseaux	2 feuilles	4 feuilles	2 feuilles
Renouée liseron	2 feuilles	4 feuilles	
Dicotylédones émergentes			
Gaillet		2 feuilles	2 feuilles
Géranium disséqué		2 feuilles	2 feuilles
Linare sp	2 feuilles	2 feuilles	2 feuilles
Pensée des champs	2 feuilles	2 feuilles	4 feuilles
Véroniques de Perse	2 feuilles	2 feuilles	4 feuilles
Dicotylédones diverses			
Capselle			
Colza (repousses)	4 feuilles		
Coquelicot			
Matricaire camomille	2 feuilles		
Mouron des oiseaux			
Moutarde des champs ou Sanve			
Rumex sp (graines)			
Séneçon vulgaire			
Dicotylédones vivaces			
Chardon des champs			
Liseron des haies			
Liseron des champs			
Renoncule rampante			
Rumex sp (souches)			
Graminées			
Digitaire sanguine	3 feuilles	3 feuilles	3 feuilles
Digitaire filiforme	2 feuilles	2 feuilles	2 feuilles
Folle avoine			
Panic faux-millet	3 feuilles	3 feuilles	
Panic pied-de-coq	3 feuilles	3 feuilles	
Pâturin annuel			
Ray-grass			
Sétaires sp			
Vulpin			



Callisto®

syngenta®

conseilspro

► N° Indigo 0 825 00 52
► www.syngenta.fr

Syngenta Agro S.A.S. 1, avenue des Prés - CS 10537 - 78286 Guyancourt Cedex. Tél. : 01 39 42 20 00 ; Fax : 01 39 42 20 10. Capital social : 22 543 902,80 Euros ; Siren B 433 886 934 RCS Versailles ; TVA FR63433886934.

CALLISTO® - AV 9900047 - Composition : 100 g/l mésotrione*. Xi-Irritant. N-Dangereux pour l'environnement. R36, R50/53. CASPER® - AV 2090037 - Composition : 50 g/kg prosulfuron* + 500 g/kg dicamba (sel de sodium)*. N-Dangereux pour l'environnement. R38, R50/53. MILAGRO® - AV 9100438 - Composition : 40 g/l nicosulfuron**. Xi-Irritant. N-Dangereux pour l'environnement. R38, R50/53.

® Marque enregistrée et *substance active d'une société du groupe Syngenta. **substance active de Ishihara Sangyo Kaisha Ltd Japan.

Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette du produit ou www.syngenta.fr

Respecter la réglementation en vigueur et les recommandations des guides de bonnes pratiques officiels disponibles sur le site <http://e-phy.agriculture.gouv.fr>. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez demander à ne pas recevoir nos offres et informations commerciales ou autres informations. Vous pouvez exercer vos droits soit en adressant un courrier électronique à partir de la rubrique «Nous contacter» du site www.syngenta.fr soit en envoyant un courrier au Département Marketing : Syngenta Agro SAS, 1, avenue des Prés CS 10537-78286 Guyancourt Cedex.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.