

PECTOLIT 2010 - Mode d'emploi

• **Dosage : 1 dosette pleine (100g) pour 2 litres d'eau tiède (38-40°C).**

Soit une concentration de 50g /litre (ne pas tenir compte de la graduation du gobelet car elle ne correspond pas à des grammes mais à des millilitres).

Durée d'utilisation : PECTOLIT peut être utilisé sans danger et sans limite de durée. Il peut être distribué en curatif et en préventif.

Il se dissout très facilement dans l'eau ainsi que dans le lait ; le mélange reste homogène et le produit ne « descend » pas au fond du seau.

• **Veaux :**

En cas de diarrhée, arrêter le lait et distribuer 2 litres de PECTOLIT 2, voire 3 fois par jour si le veau est déshydraté et/ou pèse plus de 60kg.

Continuer avec PECTOLIT seul tant que le veau a la diarrhée. Les veaux guérissent plus rapidement si on stoppe le lait pour ne donner que PECTOLIT. Il contient de la poudre de lactosérum, donc le veau continue à fabriquer les enzymes nécessaires à la digestion du lait.

Après la période d'utilisation de PECTOLIT seul, il est recommandé de faire une transition en revenant progressivement à l'alimentation lactée :

- 1 ou 2 repas moitié lait - moitié PECTOLIT (1/2 dosette),
- puis, au moins 2 repas avec 25 à 50g de PECTOLIT ajoutés au lait (1/4 à 1/2 dosette).

Utilisation en préventif :

Pendant les périodes à risque (1er-15^{ème} jour), en particulier en présence de **CRYPTOS**, ajouter PECTOLIT à la buvée de lait :

- veaux laitiers : 25g (1/4 de dosette) ajoutés à la buvée de lait matin et soir ;
- veaux allaitants : 50g (1/2 dosette) dans 1 litre d'eau une fois par jour en plus de la tétée.

Il n'y a pas de contre-indication à utiliser un médicament anti-cryptos spécifique en complément de PECTOLIT en cas de « flambée » de cryptos.

Transition colostrum-lait:

Sur le terrain, du fait de son efficacité, de plus en plus d'éleveurs font systématiquement une transition avec PECTOLIT après la phase colostrum et



observent moins de diarrhées :

- depuis la naissance, colostrum pendant 3 jours,
- PECTOLIT seul pendant 1 jour (2 buvées),
- transition PECTOLIT - lait sur 1 à 3 jours (voir ci-dessus).

La transition colostrum-lait est d'autant plus sécurisante que les veaux sont ensuite élevés à la poudre de lait.

Pour la distribution avec un **DAL**, PECTOLIT peut être préalablement mélangé à la poudre de lait à raison de 3kg de pour 25kg de poudre.

• **Veaux de boucherie élevés sans antibiotiques préventifs:**

- 1 buvée de PECTOLIT (2 litres) à l'arrivée des veaux,
- 1 buvée de PECTOLIT le 1^{er} soir,
- pendant 1 à 2 semaines : 25g (1/4 de dosette) ajoutés à la buvée matin et soir.
- Possibilité de distribuer une buvée de PECTOLIT le midi, en particulier l'été.

• **Chevreaux et agneaux :**

Distribuer PECTOLIT 2010 à volonté (50g /litre) ; maximum 100g/jour.

En préventif à la louve : 3kg de PECTOLIT pour 25kg de poudre de lait.

• **Porcelets chétifs:**

Mélanger 50g par litre de bouillie ou 75g par kg d'aliment sec.

Observations des éleveurs :

- hausse de la quantité d'aliment ingérée grâce à l'appétence du PECTOLIT,
- meilleurs croissance,
- porcelets plus ronds, plus roses et avec un poil luisant,
- animaux moins sales (fèces plus fermes),
- moins de diarrhée et de mortalité.

• **Chevaux et poulains:**

Pour les chevaux adultes, donner PECTOLIT à volonté (50g/litres) dans un seau ; aucun risque lié à la surconsommation.

Pour les poulains, donner 50g dans 500ml d'eau à l'aide d'une bouteille simplement au goulot, sans tétine.

Mise à jour : janvier 2016