



CIBLEZ VOTRE DÉSHERBAGE

ÉPEAUTRE
TRITICALE

SEIGLE

▶ ORGE ◀

BLÉ

CULTURES TOUTES CÉRÉALES*
STADES SOUPLESSE D'UTILISATION
ADVENTICES LARGE SPECTRE



SAPEC
AGRO FRANCE

KACIK® : AMM n°2170216 – granulés dispersables WG contenant 5% d'Iodosulfuron-méthyl-sodium, 40% de diflufenicanil, 2% de florasulame et 10% de cloquintocet-mexyl ATTENTION SGH07 SGH08 SGH09 - H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. GRIMS®: AMM 2150918 – Concentrée émulsionnable (EC) contenant : Clodinafop-propargyl + Cloquintocet 100 g/l + 25g/l DANGER SGH07 SGH08 SGH09 - ©Marque déposée par SAPEC AGRO SA. Détenteur d'homologation : SAPEC AGRO SA. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine, animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez le site <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, restrictions d'emploi et contre-indications se référer à l'étiquette du produit ou www.phytodata.com. Distribué par SAPEC AGRO SAS – 2-12 rue du chemin des Femmes – Immeuble Odysée – 91300 MASSY. T. 01 69 53 98 89. www.sapecagro.fr. Distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.



**UNE ASSOCIATION
UNIQUE !**

Florasulame + Diflufénicanil

20 g/kg

HRAC* Groupe B
Absorbé par les
racines et les feuilles.

400 g/kg

HRAC* Groupe F1
Pré-levée : pénètre par
les tigelles.
Post-levée: agit par
contact de manière effi-
cace jusqu'au stade 4 f.

+ Iodosulfuron

50 g/kg

HRAC* Groupe B
Agit principalement
par voie foliaire
mais aussi par
voie racinaire.

+ Cloquintocet


100 g/kg

Safeneur permettant
une bonne sélectivité
sur orge.

(*)Herbicide Resistance Action Committee

POSITIONNEMENT

A L'AUTOMNE DÈS 3 FEUILLES



KACIK® 0,2 kg/ha + adjuvant¹

**CIBLE
DICOTYLÉDONES**

+ PÂTURIN

KACIK® 0,2 kg/ha + adjuvant¹

KACIK® 0,2 kg/ha + GRIMS® 0,4 L/ha (sauf orge) + adjuvant¹


KACIK® 0,2 kg/ha + partenaire anti-graminée² + adjuvant¹

+ RAY-GRASS

KACIK® 0,2 kg/ha + GRIMS® 0,4 L/ha (sauf orge) + adjuvant¹

KACIK® 0,2 kg/ha + partenaire anti-graminée² + adjuvant¹

EN SORTIE D'HIVER JUSQU'À FIN TALLAGE
(après un désherbage de pré / post précoce)



RECOMMANDATIONS

¹ **SUR BLÉ TENDRE**, épeautre, triticales et seigle, **KACIK® doit être appliqué en association avec un adjuvant** pour bouillie herbicide (mouillant ou huile).
SUR ORGE D'HIVER, orge de printemps, blé dur d'hiver, blé dur de printemps, **KACIK® doit être appliqué en association avec un adjuvant** pour bouillie herbicide **de type mouillant uniquement**. (Suivre la préconisation de l'adjuvant utilisé.)

² **Consulter votre technicien pour connaître les possibilités de mélanges**

- Éviter d'appliquer durant les périodes de gel.
- KACIK® doit être appliqué sur sol humide mais pas sur des sols gorgés d'eau (hydromorphie)
- Ne pas appliquer sur des céréales en mauvaises conditions végétatives particulièrement si le système racinaire est peu développé suite à un stress dû à des conditions climatiques défavorables : sécheresse, asphyxie racinaire, déficience nutritionnelle, attaque de parasite...

USAGES

Cultures	Stade	Dose	Nb d'applications	Délai avant récolte	ZNT aquatique
Céréales d'hiver et de printemps	Blé Épeautre Orge* Seigle Triticale	De 3 feuilles à fin tallage	0,2 kg/ha	1/an	DAR F (BBCH 29)
					5m céréales de printemps 20m céréales d'hiver

Ne pas appliquer sur sols artificiellement drainés pour les usages céréales d'hiver. ZNT terrestre : 5 m

DVP : 20 m (céréales d'hiver) Délai de réentrée : 48 heures

Pour les cultures de remplacement et suivantes, se référer à l'étiquette.

*Inscrit sur la liste IFBM (orge d'hiver)

DICOTYLÉDONES KACIK® 0,2 kg/ha

Alchémille	Géranium	Renouée liseron
Anthémis	Helminthie fausse-vipérine	Renouée des oiseaux
Anthriscue	Jonc des crapauds	Scandix
Bleuet	Lamier pourpre	Séneçon
Capselle	Matricaire	Stellaire
Céraiste	Mouron des champs	Véronique de perse
Chardon des champs	Moutarde – Sanve	Véronique feuille de lierre
Coquelicot	Myosotis	
Fumeterre	Pensée des champs	
Gaillet	Ravenelle	

GRAMINÉES KACIK® 0,2 kg/ha

Agrostis
Folle avoine
Pâturin annuel
Ray-grass*
Vulpin*

TS = Très Sensible (efficacité > 95%)

S = Sensible (efficacité comprise entre 85% et 95%)

MS = Moyennement Sensible (efficacité comprise entre 70% et 85%)

(*)Dans le cadre d'un programme automne suivi de sortie d'hiver

PRODUITS À USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ ATTENTIVEMENT L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.